Ciprofloxacina/ Dexametasona, solución oftálmica, 0.3% y 0.1%, frasco gotero, 5 ml. vía tópico ocular, código IGSS: 1961

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Está indicado en infecciones oculares y sus anexos, tales como conjuntivitis, blefaritis, queratitis y ulceras corneales causadas por microorganismos susceptibles a ciprofloxacino, en los cuales se requiera de la asociación de un antibiótico de amplio espectro y un antiinflamatorio esteroideo del tipo de la dexametasona. También está indicado en la profilaxis prequirúrgica y posquirúrgica ocular. El espectro antimicrobiano de ciprofloxacino incluye Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans.

Reacciones adversas: Sensación de quemazón, Hiperemia conjuntival, formación de costras en pestañas, picazón, sensación de cuerpo extraño, queratitis, Infiltrados corneales, perdida de la visión, edema palpebral, incomodidad ocular, fotofobia, reacciones de sensibilidad, lagrimeo.
Frecuentemente no definidos (Dexametasona): Cataratas, hipertensión ocular, glaucoma de ángulo abierto, daño del nervio óptico, disminución de la agudeza visual.

Precauciones de uso: Se han reportado casos de hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilácticas; por lo que, se recomienda descontinuar el tratamiento en caso de reacciones de hipersensibilidad. Se deben remover los lentes de contacto antes de la aplicación y lavar las manos antes de utilizar el medicamento.

Se recomienda evitar tocar el aplicador con la superficie ocular para evitar contaminación cruzada. El uso prolongado de dexametasona puede causar hipertensión y/o glaucoma, así como daño al nervio óptico, formación de cataras y defectos visuales.

Es necesario suspender el medicamento si se observan cambios en la visión. Los corticoesteroides puedes exacerbar las infecciones purulentas o las dadas por parásitos. Puede existir infecciones micóticas luego del uso prolongado de corticoesteroides.

El uso continuo de ciprofloxacina puede aumentar el riesgo de padecer infecciones por microorganismos no sensibles, se recomienda realizar monitoreo incluyendo biomicroscopía con lampara de hendidura y coloración con fluorescencia cuando sea necesario.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad está contraindicado en pacientes con herpes simple, queratitis dendrítica, vacuna de varicela y en otras enfermedades virales de la córnea y conjuntiva, infecciones micóticas del ojo, y en enfermedades micóticas de otras estructuras perioculares.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.