Dicloxacilina sódica, polvo para suspensión 125 mg/ 5 ml, frasco 60 ml, vía oral, código IGSS: 71

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Infecciones por Staphylococcus.
Productores de betalactamasas, incluyendo: Neumonía aguda complicada (con compromiso pleural o destrucción de parénquima).
Neumonía nosocomial no grave de inicio tardía o de inicio temprano asociada a ventilación mecánica, Artritis séptica y osteomielitis.
Impétigo ampollar, celulitis y otras infecciones de piel y tejidos blandos Linfadenitis cervical (alternativa a la amoxicilina) y otitis externa grave (supurada, forunculosis)

Reacciones adversas: Dolor abdominal, diarrea, náuseas**,** anemia, pruebas de función hepática elevadas, fiebre, hipersensibilidad, nefritis, colitis pseudomembranosa, convulsiones con dosis extremadamente altas y/o insuficiencia renal. Erupción (maculopapular a exfoliativa), Vómitos, Vaginitis.

Precauciones de uso: Monitorizar el tiempo de protombinemia si el paciente está tomando warfarina al mismo tiempo. El uso prolongado puede provocar una sobreinfección. La eliminación del fármaco en los recién nacidos es lenta.
Si una penicilina (u otro betalactámico) es esencial en un paciente con hipersensibilidad inmediata a la penicilina buscar consejo especializado para la aplicación de test de sensibilidad o utilizar un betalactámico de estructura diferente a la penicilina que provocó la hipersensibilidad o utilizar macrólidos como alternativa cuando esté indicado.

Un paciente con antecedente de erupción menor (es decir, no confluente, no pruriginosa, limitada a un área pequeña del cuerpo) o una erupción que se produjo más de 72 horas después de la administración de penicilina, probablemente no es alérgico a la penicilina. Sin embargo, en este caso y demás situaciones en la cual se administra penicilina el equipo de salud debe estar preparado a contrarrestar una reacción de hipersensibilidad inmediata y tener acceso a adrenalina para el manejo adecuado. Las penicilinas no deben ser administradas por inyección intratecal por el riesgo de encefalopatía que puede ser fatal.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad o alergia a penicilinas, hipersensibilidad a penicilinas, cefalosporinas, imipenem. Tratamiento inicial de infecciones graves. Vacunas bacterianas vivas concomitantes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.