Hidrocortisona, crema 0.25%, tubo 15-30 g, vía tópica, código IGSS: 1301

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio de síntomas inflamatorios y prurito en dermatosis que responden a corticoesteroides como: dermatitis atópica, dermatitis de contacto, dermatitis vulvar, psoriasis, dermatitis seborreica.

Reacciones adversas: Atrofia cutánea, estrías, acné, dermatitis perioral, foliculitis, picazón, cambios pigmentarios, irritación cutánea, hipertricosis, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en usos prolongados.

Precauciones de uso: La terapia tópica de largo plazo puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes.
Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.
El uso prologado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas.
Se ha reportado miopatía aguda con dosis altas de corticoesteroides.
Los corticoesteroides pueden causar problemas psiquiátricos como depresión, euforia, insomnio, cambios de humor y personalidad.
La dermatitis de contacto puede ocurrir y es diagnostica con la falla del tratamiento y el exacerbamiento de la enfermedad.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades del tracto digestivo, insuficiencia hepática, miastenia grave, infarto del miocardio, cataratas o glaucoma, osteoporosis, insuficiencia renal, patología tiroidea y colitis ulcerativa.
El tratamiento prolongado puede aumentar el riesgo de padecer Sarcoma de Kaposi.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, micosis sistémicas en pacientes post ileocolostomia durante el periodo inmediato o temprano posterior al procedimiento, para el tratamiento de la dermatitis del pañal.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.