Litio carbonato, capsula o tableta, 300 mg, Vía oral, código IGSS: 833

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento del desorden bipolar para episodios de manía aguda, hipomanía aguda o depresión bipolar aguda. Tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar.

Reacciones adversas: Leucocitosis, poliuria, polidipsia, boca seca, tremor, confusión, alteración de la memoria, cefalea, debilidad muscular, cambios electrocardiográficos, nausea, vómito, diarrea, hiperreflexia, vértigo, síntomas extrapiramidales, hipotiroidismo, acné, disminución del espesor del cabello, coma, letargia, convulsiones, toxicidad renal, toxicidad por litio, poliuria inducida por litio, ataxia.
reportados post comercialización:
alopecia, anestesia de la piel, foliculitis crónica, xerosis, psoriasis, prurito con o sin rash, ulceras cutáneas, angioedema, dress.

Precauciones de uso: Se debe vigilar los niveles séricos constantemente para mantener concentraciones terapéuticas y evitar toxicidad.
Se han reportado casos de enfermedad cardiovascular y enmascaramiento del síndrome de Brugada.
Se debe usar con precaución en pacientes con depresión o ideación suicida.
El litio puede exacerbar la sintomatología de la miastenia graves, se debe usar con precaución en estos pacientes.

Se han reportado casos de síndrome de encefalopatía especialmente en aquellos pacientes que utilizan neurolépticos de manera concomitante, en mayor frecuencia haloperidol.
Puede causar depresión del sistema nervioso y disminuir la capacidad de manejar maquinaria.
Los pacientes geriátricos suelen necesitar dosis más bajas de litio.
Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad tiroidea.
Los pacientes sensibles al litio pueden experimentar toxicidad en concentraciones de 1 a 1.5 mEq/L.
La toxicidad del líquido puede ocurrir incluso a dosis terapéuticas, si se presentan síntomas de intoxicación se debe descontinuar el tratamiento de 24 a 48 horas y reinstalar a una dosis más baja.
Se han reportado casos de síndrome nefrótico con el uso de sitio, se debe descontinuar el tratamiento en caso de padecimiento y reinstalar hasta la remisión del síndrome.
Se deben de realizar uroanálisis de rutina para evaluar la función tubular y glomerular durante la terapia de litio, los cambios súbitos o progresivos en la función renal aun dentro de los valores normales indican una reevaluación de la terapia con litio.
El litio puede precipitar el síndrome serotoninérgico, el riesgo aumenta con el uso concomitante de otros fármacos serotoninérgicos o aquellos que alteran el metabolismo de la serotonina.
Raramente se han reportado pseudotumores cerebrales, si esto ocurriera se debe descontinuar inmediatamente la terapia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Enfermedad cardiovascular severa. Primer trimestre del embarazo. Alteración de la función renal. Debilidad severa. Deshidratación. Hiponatremia severa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.