Oxcarbazepina, suspensión 300 mg/5ml, frasco, 100 ml, vía oral, código IGSS: 832

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado como monoterapia o terapia coadyuvante en el tratamiento de crisis epilépticas de inicio parcial en adultos y como monoterapia en el tratamiento de crisis epilépticas de inicio parcial en pacientes pediátricos a partir de 4 años, y como terapia coadyuvante en pacientes pediátricos a partir de 2 años con crisis epilépticas de inicio parcial.

Reacciones adversas: Mareos, Diplopía, Dolor de cabeza, Náuseas/vómitos, Nistagmo, Somnolencia, Ataxia, Marcha anormal, Temblor, Dolor abdominal, Fatiga, Vértigo, Anormalidades de la visión, Dispepsia, Erupción, Insomnio, Pensamiento anormal, Hiponatremia, Debilidad muscular, Hipotensión, Trastorno del habla, Astenia.

Precauciones de uso: Hiponatremia: es importante monitoriza los niveles de sodio. Reacción de hipersensibilidad cruzada a la carbamazepina. Reacciones dermatológicas serias.
Comportamiento e ideas suicidas. Eventos adversos cognitivos/ neuropsiquiátricos como disfunción cognitiva, somnolencia. Reacción al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos/ hipersensibilidad multiorgánica. Eventos hematológicos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a la oxcarbazepina o a alguno de sus componentes, o al acetato de eslicarbazepina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.