Romiplostim, Polvo para solución inyectable, 250 mcg, Vial de Vidrio, 5 ml, vía subcutánea, código IGSS: 10371

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) en pacientes adultos que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo, corticosteroides, inmunoglobulinas.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, artralgia, mareos, insomnio, mialgia, dolor en extremidades, dolor abdominal, contusión, infección del tracto respiratorio superior, dolor orofaríngeo, fiebre, diarrea, sarpullido, dolor abdominal superior.
dispepsia, parestesia, trombocitosis, bronquitis, sinusitis, vómito, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, mareo, diarrea, infección del tracto respiratorio superior, tos, náuseas, dolor orofaríngeo. púrpura, hinchazón periférica, urticaria, infección del oído, gastroenteritis, sinusitis.

Precauciones de uso: El tratamiento con romiplostim puede conducir a la reaparición de trombocitopenia y hemorragias después de su interrupción, especialmente cuando se administran medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios.
Se ha observado un aumento de la reticulina en la médula ósea como resultado de la estimulación del receptor de la TPO, lo que puede detectarse mediante análisis morfológicos. Se sugiere realizar análisis antes y durante el tratamiento con romiplostim.

Se establece que romiplostim solo debe utilizarse para tratar la trombocitopenia asociada a PTI. Se advierte sobre el riesgo de progresión de síndromes mielodisplásicos existentes a leucemia mieloide aguda.
La pérdida de respuesta a romiplostim debe investigarse para identificar factores causales, incluida la inmunogenicidad.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, o a alguno de los excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.