Tacrolimus, cápsula, 1 mg, vía oral, código IGSS: 10515

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para la profilaxis del rechazo de órganos, en pacientes adultos y pediátricos que reciben, trasplante alogénico de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón, o trasplante de pulmón en combinación con otros inmunosupresores.

Reacciones adversas: Temblor, hipertensión, hipofosfatemia, aumento de creatinina, infección, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, edema periférico, estreñimiento, infección del tracto urinario, hipomagnesemia, astenia, dolor abdominal, dolor, insomnio, hiperlipemia, hiperpotasemia, anemia, vómitos, dispepsia, fiebre, artralgia, dolor de espalda, diabetes mellitus, parestesia, hipopotasemia, hiperglucemia, disnea, mareos, dolor de pecho, aumento de la tos, edema, erupción cutánea, prurito, leucopenia.

Precauciones de uso: No intercambiable con productos de tacrolimus de liberación prolongada.
Controlar la glucosa en sangre debido a la aparición de diabetes, nefrotoxicidad (aguda y/o crónica): Reducir la dosis; tenga cuidado con otros fármacos nefrotóxicos.
Neurotoxicidad: incluido el riesgo de encefalopatía posterior reversible Síndrome (PRES); monitorear anomalías neurológicas; reducir o interrumpir la dosis.
Controlar los niveles de potasio sérico.
Puede requerir terapia antihipertensiva.
No recomendado para uso con sirolimus: No recomendado en hígado y trasplante de corazón debido al aumento del riesgo de reacciones adversas graves.

Reducción o suspensión de la dosis debido a hpertrofia miocárdica.
Evite las vacunas vivas.
Considere la interrupción debido a aplasia de glóbulos rojos.
Microangiopatía trombótica, incluido el síndrome urémico hemolítico y Púrpura Trombocitopénica Trombótica.
Anticoncepción:
La terapia puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas; Aconsejar a los pacientes masculinos y femeninos con potencial reproductivo que hablen con su proveedor de atención médica sobre las opciones de planificación familiar, incluida la anticoncepción adecuada, antes de comenzar el tratamiento.
Esterilidad:
Según los hallazgos en animales, la fertilidad masculina y femenina puede verse comprometida por el tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
No debe administrarse en conjunto con ciclosporinas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.