# Vitamina D (alfacalcidol), cápsula 0.25 mcg, Vía oral, código IGSS: 419

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Prevención y tratamiento de osteodistrofia renal. Tratamiento de hiperparatiroidismo secundario en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 a 5.

**Reacciones adversas:** Arritmias, confusión, estreñimiento, sequedad bucal, dolor de cabeza, hipercalcemia, letargo, sabor metálico, dolor muscular o óseo, náuseas, lentitud y vómitos.

**Precauciones de uso:** Se debe descontinuar si el paciente empieza a presentar hipercalcemia.
La toxicidad de la vitamina D puede durar hasta 2 meses después de la interrupción del tratamiento.
Se deben obtener niveles de calcio sérico al menos cada dos semanas cuando se esté realizando ajuste de dosis o descontinuación del tratamiento.
Durante el tratamiento se debe monitorizar los niveles de fosfatasa alcalina, PTH y calcio sérico.
Se debe usar con precaución en pacientes con arritmias cardíacas ya que la hipercalcemia puede agravar su enfermedad.
En pacientes con enfermedad ósea renal o función renal severamente deteriorada se puede utilizar quelantes de fosforo con combinación con alfacacidol para prevenir el aumento de fosforo sérico y la calcificación metastásica.
La hipercalcemia prolongada puede deteriorar la arterioesclerosis.
Se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedades granulomatosas, ya que pueden tener sensibilidad aumentada a la vitamina D.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los componentes, hipervitaminosis, hipercalcemia.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.