Sofosbuvir/ ledipasvir, tableta o cápsula, 400 mg/90 mg, vía oral, código IGSS: 100154

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hepatitis C, crónica en pacientes adultos y pediátricos desde los 3 años.

Reacciones adversas: Astenia, fatiga, cefalea, tos.
Nausea, diarrea, mareo, disnea, insomnio, aumento de la bilirrubina > 1.5 x ULN (<1 a 3%), aumento de la lipasa > 3 x ULN (<1 a 3%), mialgia, irritabilidad.
Elevación asintomática de la creatinina, grado 3/4.

Precauciones de uso: Se debe realizar pruebas a todos los pacientes para descartar infección por el virus de la hepatitis B antes de iniciar el tratamiento.
Se debe vigilar de cerca a los pacientes coinfectados con el virus de hepatitis B y C por reactivación de virus de hepatitis B; que estaban en tratamiento o que habían completado el tratamiento con didanosina y no estaban recibiendo terapia antiviral contra hepatitis B.
Se han reportado cosas de hepatitis fulminante, falla hepática y muerte en pacientes HBsAg positivos, así como en paciente con evidencia serológica de infección por virus de la hepatitis B resuelta.
La reactivación del virus de la hepatitis B también se ha reportado en pacientes con consumo de algún inmunodepresor o agentes de quimioterapia.
Se debe estudiar el genotipo del virus de hepatitis C, según actividad virológica y clínica para determinar la pauta de tratamiento ideal para el paciente.

Se ha observado casos graves de bradicardia y bloqueo cardiaca con el uso concomitante de amiodarona. Se prefiere evitar su uso conjunto. Si no existe una alternativa de antiarrítmico de tratamiento para el paciente se debe monitorear al paciente de manera continua especialmente durante las primeras dos semanas de tratamiento.
Puede causar una hipoglicemia sintomática en pacientes diabéticos puede causar. Se debe vigilar a los pacientes diabéticos especialmente durante los primeros 3 meses de tratamiento.
Los inductores potentes de la glucoproteína P (por ejemplo: oxcarbazepina) pueden disminuir significativamente los niveles de ledipasvir y sofosbuvir.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Coadministración concomitante con rosuvastatina y ribavirina. Uso concomitante con inductores potentes de la glucoproteína P.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.