Elbasvir/ grazoprevir, tableta o cápsula, 50 mg/100 mg, vía oral, código IGSS: 100149

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hepatitis C crónica en pacientes adultos y pediátricos desde los 12 años con al menos 30 kg de peso corporal.

Reacciones adversas: En adultos (nave o nuevos): Fatiga, cefalea
En pacientes pediátricos: Cefalea
En adultos: Fatiga, dolor abdominal, diarrea, irritabilidad, depresión.
En adultos, con ribavirina: Anemia, cefalea, fatiga, disnea, rash o prurito, irritabilidad, dolor abdominal, depresión, artralgia.
Pacientes pediátricos: Nausea.

Precauciones de uso: Se debe realizar pruebas a todos los pacientes para descartar infección por el virus de la hepatitis B antes de iniciar el tratamiento.
Se debe vigilar de cerca a los pacientes coinfectados con Hepatitis C y B por reactivación de hepatitis B durante el tratamiento para la hepatitis C.
Se han reportado casas de hepatitis fulminante, falla hepática y muerte en pacientes HBsAg positivos, así como en paciente con evidencia serológica de infección por virus de la hepatitis B resuelta. La reactivación del virus de la hepatitis B también se ha reportado en pacientes con consumo de algún inmunodepresor o agentes de quimioterapia.
Se han observado elevaciones tardías de alanina aminotransferasa (ALT) durante el tratamiento, se debe realizar pruebas de función hepática en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento, a la semana 8 y bajo cualquier indicio de alteración hepática.

Se debe estudiar el genotipo de hepatitis C, según actividad virológica y clínica para determinar la pauta de tratamiento ideal para el paciente.
No se ha demostrado eficacia en pacientes que hayan tenido falla al tratamiento.

No se debe utilizar de manera concomitante con inhibidores de OATP1B ya que puede aumentar las concentraciones plasmáticas de grazoprevir.
No se debe utilizar de manera concomitante con inductores de CYP3A o la glucoproteína P ya que puede disminuir las concentraciones plasmáticas del medicamento.
El uso de dolutegravir puede causar disminución de la glucosa, en pacientes diabéticos puede causar una hipoglicemia sintomática. Se debe vigilar a los pacientes diabéticos especialmente durante los primeros 3 meses de tratamiento.
Los inductores potentes de la glucoproteína P pueden disminuir significativamente los niveles de elbasivir y grazoprevir.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto. Pacientes con insuficiencia hepática modera o severa (Child-Pugh B o C).
Si se administra con ribavirina se deben aplicar las contraindicaciones de dicho régimen.
Administración concomitante con inhibidores del polipéptido 1B transportador de aniones orgánicos e inductores del citocromo P450 3A (CYP3A).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.