Aprepitant, cápsula, 80 mg Kit, (una cápsula 125 mg y dos cápsulas de 80 mg), vía oral, código IGSS: 10535

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En combinación con otros agentes antieméticos, está indicado en pacientes de 12 años de edad y mayores para la prevención de:
Náuseas y vómitos agudos y tardíos asociados con cursos iniciales y repetidos de quimioterapia contra el cáncer altamente emetógena, incluido el cisplatino en dosis altas.
Náuseas y vómitos asociados con ciclos iniciales y repetidos de quimioterapia oncológica moderadamente emetógena.

Reacciones adversas: Oral (adultos), Fatiga, Oral (pediatría), Neutropenia, Oral (adultos), Diarrea, Astenia, Dispepsia, Dolor abdominal, Hipo Reducción de glóbulos blancos, Alanina aminotransferasa aumentada, Oral (pediatría), Dolor de cabeza Diarrea, Disminución del apetito, Tos, Fatiga, Hemoglobina disminuida, Mareos, Hipo.

Precauciones de uso: El uso de aprepitant con inhibidores potentes o moderados de CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, diltiazem) puede aumentar las concentraciones plasmáticas de aprepitant y aumentar el riesgo de reacciones adversas relacionadas.
El uso de aprepitant con inductores potentes de CYP3A4 (p. ej., rifampicina) puede provocar una reducción de las concentraciones plasmáticas de aprepitant y una disminución de la eficacia de este último.

La coadministración de aprepitant con warfarina, un sustrato de CYP2C9, puede resultar en una disminución clínicamente significativa en el índice internacional normalizado del tiempo de protrombina.
La eficacia de los anticonceptivos puede verse reducida durante la administración y durante los 28 días siguientes a las últimas dosis.
Aprepitant puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que usan anticonceptivos hormonales que usen una alternativa eficaz o un anticonceptivo no hormonal de respaldo (p. ej., condones o espermicidas) durante el tratamiento y durante 1 mes después de la última dosis de aprepitant.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Uso concomitante con pimozida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.