Betametasona valerato, loción 0.1%, frasco 50 ml, vía tópica, código IGSS: 1385

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de las dermatosis del cuero cabelludo que responden a los corticoesteroides, como dermatitis seborreica y psoriasis; en adultos y niños mayores de 12 años.

Reacciones adversas: Atrofia cutánea, estrías, acné, dermatitis perioral, foliculitis, picazón, cambios pigmentarios, irritación cutánea, hipertricosis, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en usos prolongados.

Precauciones de uso: La terapia con corticoesteroides tópica de largo plazo puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes. Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.
El uso prologado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas.
Se debe evitar el uso prolongado en zonas extensas o con técnica oclusiva.
No debe entrar en contacto con ojos, heridas abiertas o mucosas.
El uso de corticoesteroides, así como su aplicación alrededor de los ojos o con técnica de vendaje oclusivo prologado puede ocasionar glaucoma y cataratas.
El uso prolongado de corticoesteroides está asociado con el Sarcoma de Kaposi.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, micosis sistémicas o infecciones en el cuero cabelludo, presencia de infecciones bacterianas o víricas, enfermedades atróficas de la piel, utilizar sobre ulceras, ojos, heridas profundas o acné. En niños menores de 12 años.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.