Budesonida, suspensión para inhalación, 200 mcg/ inhalación, envase aspersor de 200 dosis, Vía inhalación oral, código IGSS: 2044

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Asma bronquial, en pacientes que previamente no hayan respondido a terapia con broncodilatadores y/o antialérgicos.

Reacciones adversas: Infección respiratoria, rinitis, otitis media, nasofaringitis, congestión nasal, faringitis, rinitis alérgica, gastroenteritis viral, infección viral del tracto respiratorio superior, candidiasis oral.

Precauciones de uso: Pacientes con tuberculosis pulmonar o con infecciones fúngicas o virales de las vías respiratorias.
El paso de un tratamiento oral con corticosteroides a un tratamiento con Budesonida, debe efectuarse con especial precaución, debido principalmente a la lenta normalización de la función hipotálamo-hipófisoadrenal, previamente alterada por la corticoterapia oral y puede provocar en los pacientes sintomatología primitiva (rinitis, eccema) o experimentar cansancio, cefaleas, dolores musculares o articulares y ocasionalmente náuseas y vómitos.
Los corticosteroides inhalados pueden provocar efectos sistémicos (síndrome de Cushing, aspecto Cushingoide, supresión suprarrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, disminución de la densidad mineral ósea, cataratas, glaucoma y, más raramente, una variedad de efectos psicológicos o de comportamiento tales como hiperactividad psicomotora, trastornos del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños), en especial a dosis altas prescritas durante períodos prolongados.

Los pacientes que han sido tratados con esteroides sistémicos durante largos períodos de tiempo o altas dosis pueden tener supresión cortico-suprarrenal. Deberá vigilarse regularmente la función corticosuprarrenal de estos pacientes y reducir cuidadosamente la dosis de esteroides sistémicos.
Estos preparados no están indicados para el tratamiento de la crisis aguda asmática.
El tratamiento con Budesonida no debe suspenderse repentinamente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Estado asmático, broncoespasmo agudo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.