Cabergolina, tableta o comprimido, 0.5 mg, Vía oral, código IGSS: 1368

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de trastornos hiperprolactinémicos, ya sea idiopático o debido a adenomas hipofisarios.

Reacciones adversas: Náuseas, dolor de cabeza, mareos, astenia, fatiga, dolor abdominal, somnolencia, hipotensión postural, depresión, dispepsia, nerviosismo, visión anormal, dolor de mama, dismenorrea, sofocos, parestesia, estreñimiento agresión, fibrosis, úlcera gástrica, valvulopatía, úlcera gástrica, derrame pleural, psicosis.

Precauciones de uso: No debe utilizarse en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo.
Todos los pacientes deben someterse a una evaluación cardiovascular, incluido un ecocardiograma para evaluar la posible presencia de valvulopatía. Si se detecta enfermedad valvular, el paciente no debe ser tratado con cabergolina.
Pacientes con antecedentes de trastornos fibróticos cardíacos o extracardíacos no deben utilizar cabergolina.
No está indicado para la inhibición o supresión de la lactancia fisiológica.
Dosis iniciales mayores a 1 mg pueden ocasionar hipotensión ortostática.
Precaución en pacientes con insuficiencia hepática.
Aumento de la libido e hipersexualidad en pacientes tratados con agonistas de dopamina incluyendo cabergolina. Esto ha sido generalmente reversible al reducir la dosis o interrupción del tratamiento.

Contraindicaciones: Hipertensión no controlada.
Hipersensibilidad a los derivados del cornezuelo de centeno.
Enfermedad hepática grave.
Uso concomitante con antagonistas D2.
Historia de trastornos de fibrosis pulmonar, pericárdica o retroperitoneal.
Mujeres que planean amamantar.
Antecedentes de trastornos valvulares cardíacos sugeridos por evidencia anatómica de valvulopatía de cualquier válvula, determinados por evaluación previa al tratamiento, incluida la demostración ecocardiográfica de engrosamiento de las valvas valvulares, restricción valvular o estenosis mixta de restricción valvular.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.