Diazepam, tableta o cápsula de 5 mg, Vía oral, código IGSS: 802

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Reevaluar periódicamente la utilidad del fármaco para cada paciente individual.
Tratamiento de los trastornos de ansiedad o para el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad.
Alivio sintomático de agitación aguda, temblor, delirium tremens inminente o agudo y alucinosis, en pacientes con abstinencia a alcohol aguda.
Complemento útil para el alivio del espasmo del músculo esquelético debido a reflejos, espasmo a patología local (como inflamación de los músculos o articulaciones, o secundaria a un traumatismo), espasticidad causada por trastornos de la neurona motora superior (como parálisis cerebral y paraplejía), atetosis y síndrome del hombre rígido.
Complemento en los trastornos convulsivos no para terapia única.

Reacciones adversas: Ataxia, somnolencia

Precauciones de uso: Dependencia física clínicamente significativa.
El uso concomitante de benzodiazepinas y opioides puede provocar sedación grave, depresión respiratoria, coma y muerte.
Expone a los usuarios a riesgos de abuso, mal uso y adicción, que pueden provocar una sobredosis o la muerte.
Interrupción abrupta, dosificación rápida o reducción de diazepam después del uso continuado, o la administración de flumazenil (un antagonista de las benzodiazepinas) puede precipitar reacciones de abstinencia agudas, que puede poner en peligro la vida (por ejemplo, convulsiones).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada
Glaucoma agudo de ángulo estrecho y glaucoma de ángulo abierto a menos que los pacientes reciban el tratamiento adecuado.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.