Oxcarbazepina, tableta, 300 mg, vía oral, código IGSS:2112

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado como monoterapia o terapia coadyuvante en el tratamiento de crisis epilépticas de inicio parcial en adultos y como monoterapia en el tratamiento de crisis epilépticas de inicio parcial en pacientes pediátricos a partir de 4 años, y como terapia coadyuvante en pacientes pediátricos a partir de 2 años con crisis epilépticas de inicio parcial.

Reacciones adversas: Mareos, diplopía, dolor de cabeza, náuseas/vómitos, nistagmo, somnolencia, ataxia, marcha anormal, temblor, dolor abdominal, fatiga, vértigo, anormalidades de la visión, dispepsia, erupción, insomnio, pensamiento anormal, hiponatremia, debilidad muscular, hipotensión, trastorno del habla, astenia, informes posteriores a la comercialización, angioedema, anafilaxia, reacción de hipersensibilidad inmune multiorgánica, depresión de la médula ósea, agranulocitosis, anemia aplásica, pancitopenia, neutropenia. pancreatitis y/o aumento de lipasa y/o amilasa, deficiencia de ácido fólico, hipotiroidismo, eritema multiforme, síndrome de stevens-johnson, necrólisis epidérmica tóxica, fracturas, disminución del mineral óseo, osteoporosis, trastornos de hipersensibilidad multiorgánica caracterizados por características tales como erupción cutánea, fiebre, linfadenopatía, pruebas de función hepática anormales, eosinofilia y artralgia. reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos/ hipersensibilidad multiorgánica.

Precauciones de uso: Hiponatremia: es importante monitoriza los niveles de sodio.
Reacción de hipersensibilidad cruzada a la carbamazepina.

Reacciones dermatológicas serias.
Comportamiento e ideas suicidas.
Eventos adversos cognitivos/ neuropsiquiátricos como disfunción cognitiva, somnolencia.
Reacción al fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos/ hipersensibilidad multiorgánica.
Eventos hematológicos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida a la oxcarbazepina o a alguno de sus componentes, o al acetato de eslicarbazepina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.