Tobramicina/ Dexametasona, solución o suspensión oftálmica, 0.3%/ 0.1%, frasco gotero, 5 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 2125

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Afecciones oculares inflamatorias que responden a esteroides para las cuales está indicado un corticosteroide y donde existe infección ocular bacteriana superficial o riesgo de infección ocular bacteriana. Activo frente a los siguientes microorganismos oculares: Estafilococos, incluidos S. aureus y S. epidermidis (coagulasa positiva y coagulasa negativa), incluidos Cepas resistentes a la penicilina, Estreptococos, incluidas algunas de las especies beta-hemolíticas del grupo A, algunas especies no hemolíticas y algunos Steotococos neumonia. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, la mayoría de las cepas de Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae y H. aegyptius, Moraxella lacunata, Acinetobacter calcoaceticus y algunas especies de Neisseria.

Reacciones adversas: Picazón e hinchazón del párpado ocular, eritema conjuntival, elevación de la presión intraocular con posible desarrollo de glaucoma, daño infrecuente al nervio óptico, formación de cataratas, formación de cataratas subcapsulares posteriores, retraso en la cicatrización de heridas, infecciones secundarias, queratitis.

Precauciones de uso: Para uso tópico oftálmico no para inyección ocular. Pueden producirse reacciones adversas de hipersensibilidad a los aminoglucósidos aplicados tópicamente. Las reacciones varían desde efectos locales hasta reacciones generalizadas, como eritema, picazón, urticaria, erupción cutánea, anafilaxia, reacciones anafilactoides o reacciones ampollosas. Si se produce una reacción de sensibilidad, suspenda su uso.

El uso prolongado de esteroides puede provocar glaucoma, con daño al nervio óptico, defectos en la agudeza visual y campos de visión y formación de cataratas subcapsulares posteriores.

El uso prolongado puede suprimir la respuesta del huésped y, por lo tanto, aumentan el riesgo de infecciones oculares secundarias. En infecciones parasitarias oculares los esteroides pueden enmascarar la infección o intensificar la infección existente. En enfermedades que cusan adelgazamiento de la córnea o esclerótica pueden ocurrir con el uso de esteroides tópicos. No topar el aplicador en la conjuntiva ocular ni en superficies.

Contraindicaciones: Queratitis epitelial por herpes simple (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela y muchas otras enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva. Infección micobacteriana del ojo. Enfermedades fúngicas de las estructuras oculares. Hipersensibilidad a un componente del medicamento.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.