Verapamilo, tableta de liberación prolongada, 240 mg, vía oral, código IGSS 643

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hipertensión, para bajar la presión arterial.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, hiperplasia gingival, estreñimiento, mareos, hipotensión, dispepsia, náuseas, edema, erupción, aumento de las enzimas hepáticas, alteración del sueño, disnea.

Precauciones de uso: Evitarse en pacientes con disfunción ventricular izquierda severa (p. ej., fracción de eyección inferior al 30 %) o síntomas moderados o graves de insuficiencia cardíaca y en pacientes con cualquier grado de disfunción ventricular si están recibiendo un bloqueador beta-adrenérgico.
Ocasionalmente puede ocurrir una disminución en los niveles normales de presión arterial lo que puede resultar en mareos o hipotensión sintomática.
Elevaciones de transaminasas con y sin elevaciones concomitantes de fosfatasa alcalina y bilirrubinas han sido reportadas.
El efecto del verapamilo en la conducción auriculoventricular y el nódulo sinoauricular puede causar bloqueo auriculoventricular de primer grado asintomático y bradicardia transitoria, a veces acompañada de ritmos de escape nodal.
En pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden aparecer una variedad de efectos adversos serios.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al verapamilo u otros bloqueadores de los canales de calcio.
Shock cardiogénico.

Insuficiencia cardíaca congestiva.
Hipotensión sintomática.
Síndrome del seno enfermo (a menos que tenga un marcapasos permanente).
Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado (a menos que tenga colocado un marcapasos permanente).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.